

probleemsignalen	mogelijke oorzaken	aanpakmogelijkheden
de baby gaat niet aan de borst	slaperige baby, gefrustreerde baby (hardhandig aanleggen, uitzuigen, enz.), te kort tongriempje, pijn (spruw, sleutelbeen, of hoofdje bijv.), ziek	slaperige baby stimuleren, overprikkelde baby kalmeren, veel aandacht voor aanleggen, andere houding proberen, eventuele problemen bij de baby behandelen, indien na één etmaal geen verbetering: kolven en gekolfde melk bijgeven met vingervoeden om baby te leren zuigen
de baby drinkt minder dan 7 maal per etmaal en is erg slaperig	slaperige baby	aantal voedingen opvoeren, wakker maken, veel aandacht voor het aanleggen, indien na één etmaal geen verbetering: kolven en gekolfde melk bijgeven aan de borst met sonde, of met cupje of lepeltje
tijdens het voeden maakt de baby geen grote slikbewegingen, maar zuigt te oppervlakkig, of te weinig	verkeerd aanleggen, verkeerde drinktechniek, verminderde melkproductie	het aanleggen en de drinktechniek verbeteren, melkproductie opvoeren door vaak aanleggen, toeschiet-reflex stimuleren, wissel-voeden, indien na één etmaal geen verbetering: kolven en gekolfde melk bijgeven, bij voorkeur aan de borst met sonde
de moeder heeft pijn aan de tepel(s) gedurende de hele voeding	verkeerd aanleggen, verkeerde drinktechniek	het aanleggen en de drinktechniek verbeteren,
de moeder heeft tijdens het voeden pijn aan de tepel(s), en heeft na het voeden een brandende, schrijnende pijn	schimmelinfectie,	adviseer behandeling met antimycotica, neem hygiëne-maatregelen

probleemsignalen	mogelijke oorzaken	aanpakmogelijkheden
de moeder heeft stuwingsklachten, de borsten zijn gezwollen, pijnlijk, rood, en warm	te weinig aanleggen, verkeerd aanleggen, verkeerde drinktechniek	melkdoorstroming stimuleren door vaker voeden, en het aanleggen en de drinktechniek verbeteren, warmte voor het voeden, zonodig één of twee keer kolven, eventueel na de voeding koude gebruiken
de ontlasting is op de 4 ^e of 5 ^e dag nog niet lichter van kleur of de baby heeft een etmaal geen ontlasting-luier, de baby valt op dag 5 á 6 nog steeds af, of valt 10% of meer van zijn geboortegewicht af	verkeerd aanleggen, verkeerde drinktechniek, verminderde melkproductie	het aanleggen en de drinktechniek verbeteren, melkproductie opvoeren door vaak aanleggen, indien na één dag geen verbetering gaan kolven en gekolfde melk bijgeven (evt ook aangevuld met kunstvoeding)
de voedingen duren vaak een half uur of langer per borst	verkeerd aanleggen, verkeerde drinktechniek	het aanleggen en de drinktechniek verbeteren
de baby is meestal niet voldaan na de voeding, maar huilt en is ontevreden	verkeerd aanleggen, verkeerde drinktechniek, verminderde melkproductie	het aanleggen en de drinktechniek verbeteren, melkproductie opvoeren door vaak aanleggen, indien dit na één dag geen verbetering geeft, gaan kolven en gekolfde melk bijgeven
de baby huilt vaak na de voeding, en lijkt dan buikpijn te hebben	lucht happen tijdens de voeding, voedselovergevoeligheid, allergie	aanleggen verbeteren, maatregelen bij te snelle melkstroom, dieetmaatregelen